

VARKENS ARTSEN



coöperatief | betrokken | deskundig

Varkensnieuwsbrief | februari 2019 t/m april 2019

Inhoud

- Hebben mijn biggen nu slingerziekte of speendiarree?!
- Rookmachine
- Voorstellen student Diergeneeskunde
- Studieclubs
- Samenwerking Lingehoeve
- Naaldencontainers
- Apotheeknieuws

www.varkensartsen.nl




Hebben mijn biggen nu slingerziekte of speendiarree?!

Slingerziekte en speendiarree; ze worden vaak in één adem genoemd en komen beide voornamelijk voor bij gespeende biggen, maar het zijn wel degelijk twee heel verschillende ziektebeelden. Hoewel ze allebei door een *Escherichia coli* (E.coli) worden veroorzaakt, is de manier waarop ziekte ontstaat heel verschillend.

E.coli is een veelvoorkomende bacterie die van nature voorkomt in varkens en andere zoogdieren, meestal zonder ziekte te veroorzaken. E.coli kan echter ook tot ziekte leiden, zoals speendiarree (ETEC, die entero-toxine produceert) en slingerziekte/oedeemziekte (VTEC, die Shiga-toxine produceert).

Beeld speendiarree in de stal:

- Meestal 3-7 dagen na spenen
- Waterdunne, gele tot lichtbruine diarree (soms braken ervoor)
- Goede eetlust, veel drinken
- Eindfase: diepe, stotende ademhaling en diepliggende ogen
- Sterfte kan tot 30% oplopen



Diarree op roostervloer >

Diagnose, therapie en preventie zijn grotendeels hetzelfde

Een vermoeden van zowel speendiarree als oedeemziekte kan bevestigd worden met mestonderzoek en/of door sectie op biggen te doen. Ook bij speendiarree is sectie raadzaam (naast mestonderzoek), aangezien het type ETEC ook in gezonde biggen kan voorkomen. Therapie bestaat uit antibioticum over voer of door water. Daarnaast kunnen elektrolyten en extra water worden gegeven in biggenkommen, om herstel zo veel mogelijk te bevorderen.

Preventie is het belangrijkste!

- Zorg dat de biggen voor het spenen veel vast voer hebben leren eten.
- Zorg voor genoeg voerplaatsen voor de biggen na spenen. Voorkom echter een overmaat aan voeropname; dit is een risicofactor voor het ontstaan van oedeemziekte.
- Water aanzuren.
- Hygiënisch werken (reinigen en desinfectie na elke ronde; werken van jong naar oud; materiaal en handen reinigen).
- Zorg voor schoon en fris drinkwater.
- Werk zo veel mogelijk all-in-all-out.
- Voorkom stress zo veel mogelijk (zo min mogelijk mengen bij opleggen, voorkom koude afdelingen).
- Er zijn in Nederland enkele vaccins geregistreerd tegen oedeemziekte bij gespeende biggen. Informeer bij uw dierenarts naar mogelijkheden. 📞

Beeld oedeemziekte in de stal:

- Meestal 10-14 dagen na spenen
- Oedeem (vochtophoping) in onder andere bovenoogleden, te zien aan zwelling
- Slome biggen die soms blind lijken
- Biggen met incoördinatie en slechte balans
- In vroege gevallen: een piepend/hees stemgeluid
- Diarree kan voorafgaan aan andere verschijnselen
- Biggen in zijligging/ fietsen
- Plotselinge sterfte die hoog kan oplopen



Big met dikke oogleden >

Rookmachine

Sinds kort hebben we als coöperatie de beschikking over een rookmachine, waarmee we klimaatmetingen kunnen doen. Met rook kunnen we zichtbaar maken hoe de lucht zich door de stal beweegt. Als u weet hoe de lucht zich beweegt, kunt u gerichte maatregelen treffen om het stalklimaat te verbeteren. Laat het uw dierenarts weten als u interesse heeft in het laten uitvoeren van een meting!

Voorstellen student Diergeneeskunde



Sinds januari loopt Karin Kreuger haar coschappen bij onze praktijk. Karin zit in de eindfase van haar studie en heeft aangegeven zich verder te willen verdiepen in de varkenshouderij. Om die reden heeft u haar mogelijk al ontmoet

tijdens een bedrijfsbezoek of gaat u haar nog ontmoeten. Daarnaast heeft ze een interessant artikel geschreven over E. coli-problematiek bij gespeende biggen, dat u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Studieclubs

Met enige regelmaat worden we als dierenartsen gevraagd om een bijdrage te leveren op een studieclubbijeenkomst van varkenshouders. Zo heeft onze collega Johan Hulzing de afgelopen maand enkele presentaties gegeven over de diagnostiek en aanpak van Mycoplasma. Ook geïnteresseerd in deze presentatie? Of een ander onderwerp? Laat het ons weten, zodat wij ook u en uw studieclub mogelijk van dienst kunnen zijn.

Infectieketen van M.hyo



Samenwerking Lingehoeve

Per 1 februari verwelkomen we Wim Breukers van De Lingehoeve als dierenarts bij de coöperatie. Wim blijft als dierenarts zijn klanten bedienen als varkensdierenarts, maar heeft nu ook het team van Varkensartsen

achter zich staan. We hopen dat jullie je snel thuisvoelen bij de Coöperatie Varkensartsen! Wim's UDN is 124044. Door deze kennismaking is Wim bevoegd om op uw IKB-bedrijf te acteren.

Naaldencontainers

In samenwerking met Stericycle DRS bieden wij alle vermeerderingsbedrijven een naaldencontainer aan om op een veilige manier gebruikte naalden weg te kunnen gooien. Deze zogenoemde sharpsafes worden gratis verstrekt. Als de sharpsafe vol is, is het mogelijk om deze mee te geven aan uw dierenarts. De kosten van het afvoeren zijn 8 euro.



Apotheeknieuws



In verband met een gunstigere registratie stappen we de komende maanden over van Tylucyl naar het middel Pharmasin. Pharmasin bevat dezelfde werkzame stof tylosine en heeft dezelfde werking.

Daarnaast is ook de dosering waarin het gebruikt mag worden hetzelfde.

Tot slot, de naam van Suvaxyn PCV wordt Suvaxyn Circo. 📢



Bestellen en bezorgen

Medicijnen die 's ochtends voor 12.00 uur besteld zijn, kunt u de volgende werkdag aan huis bezorgd krijgen. Bestellingen vanaf €500 worden gratis bezorgd, voor bedragen daaronder rekenen we bezorgkosten van €22,35 (dit is inclusief gekoeld vervoer en zonder gewichtsbepanking). 📢

Eigen bestellijst

Wij kunnen voor uw bedrijf bestellijsten samenstellen, waar uw bedrijfsspecifieke middelen op staan. Interesse? Mail dit verzoek dan naar apothek@varkensartsen.nl. Op de bestellijst kunt u eenvoudig invullen wat u nodig heeft. Stuur de ingevulde lijst vervolgens ook naar apothek@varkensartsen.nl. 📢